

# 南卡罗来纳州的 的蜱虫



SOUTH CAROLINA  
DEPARTMENT OF  
PUBLIC HEALTH



蜱虫吸食动物和人类的血液。蜱虫生活在草丛、灌木丛和树丛中，等待宿主出现。不同种类蜱虫的生命周期存在重合，因此蜱虫总是在特定季节出现。

蜱虫能够携带生物体或毒素，会引发严重疾病，甚至有时会引发致命疾病，例如无形体病、埃里希体病、莱姆病、斑点热群立克次体以及兔热病，或红肉过敏症以及蜱麻痹等病症。

## 蜱虫的体型大小不一

- 幼年蜱虫像罂粟种子一样小。
- 部分种类的成年蜱虫大小可达 0.2 英寸 (5 毫米)。
- 吸饱血的雌性蜱虫大小可达 0.6 英寸 (15 毫米)。




## 蜱虫叮咬预防贴士

采取预防措施，降低蜱虫叮咬几率。

- 常年喷洒含有 20% 或以上 EPA 认证为驱蜱剂的活性成分 (例如 DEET) 的驱虫剂。
- 穿长裤，将裤腿扎进袜筒。
- 穿衣前用 0.5% 的氯菊酯喷洒衣物，该物质在衣物清洗数次后仍可提供防护。
- 避免进入拥有高大植被的树丛和灌木丛区域。
- 行走/徒步时走在道路中间。

## 检查身上是否有蜱虫，并安全清除附着在皮肤上的蜱虫

- 时常进行蜱虫检查，及时清除附着蜱虫，从而降低蜱虫传播疾病的几率。
- 从户外返回后要洗澡。
- 使用尖嘴镊子去除蜱虫。
- 不要挤按蜱虫或使用热物、指甲油、凡士林或其他材料去除蜱虫。这会导致蜱虫将体液反刍至叮咬区域，从而增加患病风险。



- 用尖头镊子靠近皮肤来夹住蜱虫。

- 均匀、稳定用力，夹起蜱虫。不要猛拉或拧动蜱虫。这样可能会使蜱虫的口器断裂在皮肤中。
- 使用肥皂或水清洗叮咬区域。涂抹消毒剂，例如碘酒、过氧化氢或酒精。
- 记录蜱虫叮咬日期。
- 如果出现发烧、皮疹、头痛、关节或肌肉疼痛等症状，请联系医生。如果能够及早发现，许多蜱传疾病都可以得到有效治疗。

## 在南卡罗来纳州以下种类蜱虫最常见。



### 相关疾病风险或病症包括：

- **美洲花蜱:** 埃里希体病、红肉过敏症、南方蜱相关皮疹病 (STARI)、斑点热群立克次体以及兔热病
- **海湾蜱:** 埃里希体病、斑点热群立克次体以及蜱麻痹
- **美洲犬蜱:** 埃里希体病、落基山斑疹热 (RMSF)、蜱麻痹以及兔热病
- **黑腿蜱:** 无形体病、巴贝西虫病、莱姆病、波瓦桑病毒疾病以及红肉过敏症
- **棕色犬蜱:** 埃里希体病、落基山斑疹热以及兔热病。

要详细了解南卡罗来纳州  
蜱虫传播疾病以及病症  
(包括症状)，  
请扫描二维码或访问  
[dph.sc.gov/ticks](http://dph.sc.gov/ticks)。

