

What You Need to Know About MPOX



SOUTH CAROLINA
DEPARTMENT OF
PUBLIC HEALTH

What is mpox?

Mpox is a viral infection transmitted through close personal contact, including kissing, sex, and other skin-to-skin contact.

What are symptoms of mpox?



Photo Credit:
UK Health Security Agency



Photo Credit:
UK Health Security Agency

- **Painful skin rash**

Some people may experience:

- **Fever**
- **Headache**
- **Muscle aches**
- **Swollen Lymph Nodes**

Symptoms can appear within 21 days after exposure.



Photo Credit: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

What if I think I have mpox?

You should see your usual healthcare provider or visit an urgent care.

How do I get mpox?



Mpox spreads between people primarily through direct contact with infectious sores, scabs; the highest risk is during intimate contact between

people, including sex, kissing, or hugging and touching personal items that were used by a person with mpox, such as bedding and towels.

How can I prevent mpox?

- Avoid intimate contact with people recently diagnosed or who recently may have been infected.
- Get vaccinated against mpox if you believe yourself to be at risk.
- Be aware that mpox is usually spread by sex with a person infected with mpox.
- Wear a face mask if you are in close contact with someone who has symptoms.
- Wash your hands with soap and water or use hand sanitizer, especially after coming into contact with those who are infected—or suspected infected.

For more information on mpox, please visit:

dph.sc.gov/MPX

cdc.gov/mpox

Información importante que debe saber:

VIRUELA DEL MONO



SOUTH CAROLINA
DEPARTMENT OF
PUBLIC HEALTH

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una infección vírica que se transmite a través del contacto físico estrecho, como los besos, las relaciones sexuales y otros tipos de contactos piel con piel.

¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono?



Crédito de la fotografía:
UK Health Security Agency

- **Sarpullido doloroso en la piel**

Algunas personas pueden presentar lo siguiente:

- **Fiebre**
- **Dolor de cabeza**
- **Dolor muscular**
- **Inflamación de ganglios linfáticos**

Los síntomas pueden aparecer dentro de los 21 días después de la exposición.



Crédito de la fotografía:
UK Health Security Agency



Crédito de la fotografía: NHS England High Consequence Infectious Diseases Network

¿Qué debo hacer si creo que tengo viruela del mono?

Debe consultar a su proveedor de atención médica habitual o acudir a un centro de atención de urgencia.

¿Cómo se contagia la viruela del mono?



La viruela del mono se propaga entre las personas principalmente a través del contacto directo con llagas o costras infecciosas. El mayor riesgo de contagio se produce

durante el contacto íntimo, incluidas las relaciones sexuales, los besos y los abrazos, o al tocar objetos personales que utilizó una persona infectada, como ropa de cama y toallas.

¿Cómo se puede prevenir la viruela del mono?

- Evite el contacto íntimo con personas diagnosticadas recientemente o que puedan haberse infectado hace poco.
- Vacúnese contra la viruela del mono si cree que está en riesgo.
- Tenga en cuenta que la viruela del mono suele contagiarse al tener relaciones sexuales con una persona infectada.
- Utilice una mascarilla si tiene contacto cercano con alguien que presenta síntomas.
- Lávese las manos con agua y jabón o utilice desinfectante para las manos, especialmente después de estar en contacto con personas infectadas (o con sospecha de infección).

Para obtener más información sobre la viruela del mono, visite:

dph.sc.gov/MPX

cdc.gov/mpox