

What Everyone Needs to KNOW ABOUT MPOX

WHAT IS MPOX?

Mpox is a viral infection transmitted through close personal contact, including kissing, sex, and other skin-to-skin contact.

Symptoms begin from 5–21 days after exposure. Someone with mpox may be able to spread the disease one to four days before symptoms begin.

WHAT ARE THE SYMPTOMS?



PAINFUL RASH, BUMPS, OR BLISTERS

These may appear anywhere on the body, including the genitals. This may look similar to syphilis, herpes, or other common skin rashes, including acne.



FEVER & HEADACHES



MUSCLE ACHES



SWOLLEN LYMPH NODES

WHAT YOU CAN DO



STAY INFORMED

For more information, visit **DHEC** or **CDC** websites for up-to-date guidance.



CONTACT

If you have symptoms, call (do not visit) your health care provider, and ask about testing.



TAKE A BREAK

If you have symptoms, stay at home, wear a mask, and cover sores to protect others until you learn if you have mpox.



Anyone can get mpox, but the risk to the general public is low at this time.

Although the majority of cases have occurred among men who have sex with men, no group should be stigmatized.

Mpox spread can be stopped by avoiding intimate contact with someone who is ill with a rash and vaccinating those at high risk for exposure.



Información que todos debemos CONOCER SOBRE LA VIRUELA DEL MONO

¿QUÉ ES LA VIRUELA DEL MONO?

La viruela del mono es una infección vírica que se transmite a través del contacto físico estrecho, como los besos, las relaciones sexuales y otros tipos de contactos piel con piel.

Los síntomas comienzan entre 5 y 21 días después de la exposición. Una persona infectada con la viruela del mono puede contagiar la enfermedad entre uno y cuatro días antes de que aparezcan los síntomas.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?



SARPULLIDO, BULTOS O AMPOLLAS QUE PROVOCAN DOLOR

Estos pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso en los genitales. Suelen ser similares a las lesiones causadas por la sífilis, el herpes u otras erupciones cutáneas comunes, como el acné.



FIEBRE Y DOLOR DE CABEZA



DOLOR MUSCULAR



INFLAMACIÓN DE GANGLIOS LINFÁTICOS

MENOS FRECUENTES

ESTO ES LO QUE PUEDE HACER



MANTÉNGASE INFORMADO

Visite el sitio web del Departamento de Salud y Control Ambiental (Department of Health and Environmental Control, DHEC) o de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) para obtener información adicional y orientación actualizada.

COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR

Si presenta síntomas, llame (no acuda) a su proveedor de atención médica y pregunte por las pruebas.

TÓMESE UN DESCANSO

Si tiene síntomas, quédese en su casa, use una mascarilla y cubra las lesiones para proteger a los demás hasta que sepa si presenta o no viruela del mono.



Cualquiera puede contraer la viruela del mono, pero el riesgo para el público en general es bajo en este momento.

Si bien la mayoría de los casos se produjeron entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, no se debe estigmatizar a ningún grupo.

La propagación de la viruela del mono se puede detener al evitar el contacto íntimo con una persona enferma que presenta sarpullido, y al vacunar a aquellos con alto riesgo de exposición.

