

Para obtener más información, visite:

scdhec.gov/PrEP

Llame al: 1-800-322-2437



Visite el sitio web para consultar nuestra lista completa de proveedores de PrEP cerca de usted.



Versión digital de este material



PrEPMeSC

Tome el control de su salud: esté PrEPParado.



¿Qué es la “profilaxis previa a la exposición”?

La profilaxis previa a la exposición, o PrEP, es una medicación que se toma para prevenir la infección de VIH en personas que no lo tienen, pero que corren riesgo considerable de contraer la enfermedad.

¿Qué es la PrEP?

La píldora (de marca Descovy o Truvada) contiene dos medicamentos (tenofovir y emtricitabina) que se utilizan en combinación con otros medicamentos para tratar el VIH. Cuando una persona se expone al VIH a través de relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables, estos medicamentos actúan para prevenir la infección.

El inyectable (marca Apretude) es la única inyección “inyectable” aprobada para el uso de la PrEP.



Utilizar preservativos y tomar PrEP van de la mano; nunca debe considerar uno sin el otro.

¿Quién debe considerarla?

Las nuevas directrices federales para los proveedores de atención sanitaria recomiendan que se considere la PrEP para personas VIH negativas con alto riesgo de infectarse.

- » Cualquier persona que tenga una relación en curso con una persona VIH positiva o haya estado en pareja con personas cuya situación respecto del VIH se desconozca. La PrEP también se recomienda para aquellas personas VIH negativas que desean concebir y tienen una pareja VIH positiva.
- » Hombre o mujer heterosexual que habitualmente no usa condón cuando tiene relaciones con personas cuya situación respecto del VIH se desconoce y que presenta un riesgo considerable de contraer la enfermedad (por ejemplo, personas que se inyectan drogas o tienen parejas bisexuales masculinas).
- » Personas que se inyectan drogas y comparten agujas con personas cuya situación respecto del VIH se desconoce.

¿Qué implica tomar PrEP?

La PrEP es una herramienta de prevención del VIH muy eficaz y, combinada con preservativos y otros métodos de prevención, puede proporcionar una protección aún mayor que si se utiliza sola. Las personas que utilicen PrEP deben comprometerse a tomarla tal y como se les prescriba y a visitar a su médico cada 2-3 meses para someterse a pruebas de VIH/ enfermedades de transmisión sexual (ETS) y a otras pruebas de seguimiento.

¿Cuál es la eficacia de la PrEP?

Se ha demostrado que, si se toma a diario, la PrEP reduce en más de un 90 % el riesgo de infección de VIH en personas de alto riesgo. La PrEP es mucho menos eficaz si no se toma de forma sistemática. La PrEP también tiene una eficacia del 70 % en consumidores de drogas inyectables.

¿Cómo pago la PrEP?

La mayoría de las compañías de seguros y Medicaid cubren la PrEP. Si no tiene seguro, existen programas de copago y asistencia al paciente. Para obtener más información sobre las opciones de pago y una lista de los proveedores cercanos a usted, visite nuestro sitio web en scdhec.gov/PrEP

