

Información para los padres  
De niños en edad escolar

## Impétigo



### Su hijo tiene sarpullido que puede ser impétigo.

Su niño tiene sarpullido que puede ser impétigo. El impétigo es una infección de la piel causada por una bacteria que frecuentemente infecta llagas, picaduras de insectos y otros sarpullidos de la piel. Es muy contagioso y puede transmitirse fácilmente a otras personas.

### Tratamiento en casa para casos de impétigo leve

Si su hijo tiene una o dos llagas pequeñas tal vez se puedan tratar con una pomada o crema de antibiótico triple que se puede comprar sin receta. Pídale a al farmacéutico que le ayude a escoger una que sea la adecuada para su niño. Lea y siga las instrucciones de la etiqueta de la medicina.

Antes de aplicar la medicina, quite las costras al remojar las llagas en agua tibia por 5 minutos. Después de remojarlas, lave las llagas con una toallita, agua tibia y jabón antibacterial como Dial™ o Safeguard™.

Si su hijo(a) tiene impétigo en la nariz, puede ser necesario poner una cantidad pequeña de pomada en un hisopo y aplicarla a las llagas en la nariz.

Lávese las manos y lávele las manos a su niño para evitar transmitir la infección a otras personas.

Repita el tratamiento tres veces al día o de acuerdo a las instrucciones en la etiqueta de la medicina.

### Evite que el impétigo se contagie a otras personas

Mantenga la toalla y las toallitas de su niño separadas de los otros miembros de la familia. Lave las toallitas, las toallas, las sábanas y la ropa con agua caliente. Seque en una secadora a temperatura alta o en el sol.

Mantengas las uñas del niño limpias y cortas para que no se arañe y extiende el sarpullido.

Cubra las llagas si están supurando o drenando. Lávese las manos cuidadosamente después de cambiar las curitas.

Será necesario que su hijo se quede en casa y que no vaya a la escuela o guardería. Su hijo puede regresar a la escuela o guardería 24 horas después de que el tratamiento con antibióticos se haya iniciado y el sarpullido empieza a cicatrizar.

### ¿Cuándo es necesario que los niños con impétigo sean atendidos por un proveedor de atención médica?

Será necesario que su niño sea atendido por un médico o una enfermera practicante si:

- Las llagas se extienden a otras partes del cuerpo,
- En un área hay más que unas pocas llagas,
- El sarpullido no se mejora después de 1 a 2 días de aplicar el medicamento.
- Las llagas se ponen rojas, hinchadas o le duelen
- Su niño empieza a sentirse enfermo
- La temperatura tomada por la boca es de 101°F o superior o de 100°F o superior tomada debajo del brazo.

*Las marcas usadas en este documento sólo sirven como ejemplos. SCDHEC no promociona ninguna de las marcas que aparezcan en este documento.*

*Para mayor información sobre la exclusión de un niño que tiene impétigo, vea (Las listas de exclusión de la guardería y la escuela por razones de enfermedades contagiosas de DHEC) en [www.scdhec.gov/health/disease/exclusion.htm](http://www.scdhec.gov/health/disease/exclusion.htm)*

Nombre del niño \_\_\_\_\_

Enfermera de la escuela \_\_\_\_\_

Fecha \_\_\_\_\_

Escuela \_\_\_\_\_

Número de la escuela ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

