

Acetaminophen Dosage Chart FOR PAIN AND/OR FEVER

Weight Range	Age Range	Infant Drops 160 mg/5 mL	Children's Liquid 160 mg/5 mL	Children's Chewable Tablets 160 mg each	Children's Dissolvable Packets 160 mg/powder pack
6-11 lbs.	0-3 months	1.25 mL	Do Not Give	Do Not Give	Do Not Give
12-17 lbs.	4-11 months	2.5 mL	Do Not Give	Do Not Give	Do Not Give
18-23 lbs.	12-23 months	3.75 mL	Do Not Give	Do Not Give	Do Not Give
24-35 lbs.	2-3 years	_____	5 mL	1 tablet	Do Not Give
36-47 lbs.	4-5 years	_____	7.5 mL	1½ tablets	Do Not Give
48-59 lbs.	6-8 years	_____	10 mL	2 tablets	2 packets
60-71 lbs.	9-10 years	_____	12.5 mL	2½ tablets	2 packets
72-95 lbs.	11 years	_____	15 mL	3 tablets	3 packets

- **Always use an accurate measuring dropper, syringe or cup!**
- **Only use the infant dropper in the package to give an infant drops!**
- Do not use kitchen spoons, as these are not a standard size or measure.
- Do not give acetaminophen with another medicine that also contains acetaminophen.
- You may give a dose every 4-6 hours, up to four doses in 24 hours. Do not give more than the dosage chart says.
- Do not take with alcohol. Some medicines, such as liquid cold medicine, could contain alcohol. Taking acetaminophen with alcohol can cause liver damage.
- Talk to your infant's health care provider before giving acetaminophen if your infant is younger than 6 months old.
- **Do not give both ibuprofen and acetaminophen at the same time.**
- **Taking too much acetaminophen can cause permanent liver damage or death!**
- **Store acetaminophen in a cool dry area, away from the reach of children.**
- Contact your child's health care provider **RIGHT AWAY** if your child takes too much acetaminophen!



Table de dosificación de acetaminofén PARA EL DOLOR Y/O LA FIEBRE

Peso	Edad	Gotas para bebés 160 mg/5 mL	Líquido para niños 160 mg/5mL	Comprimidos masticables para niños 160 mg por comprimido	Paquetes para dissolver 160 mg por paquete
6-11 lbs.	0-3 meses	1.25 mL	No usar	No usar	No usar
12-17 lbs.	4-11 meses	2.5 mL	No usar	No usar	No usar
18-23 lbs.	12-23 meses	3.75 mL	No usar	No usar	No usar
24-35 lbs.	2-3 años	_____	5 mL	1 comprimido	No usar
36-47 lbs.	4-5 años	_____	7.5 mL	1½ comprimido	No usar
48-59 lbs.	6-8 años	_____	10 mL	2 comprimido	2 paquetes
60-71 lbs.	9-10 años	_____	12.5 mL	2½ comprimido	2 paquetes
72-95 lbs.	11 años	_____	15 mL	3 comprimido	3 paquetes

- **¡Utilice siempre un gotero, una jeringa o una taza medidora!**
- **Para medir las gotas para el bebé, use solamente los goteros que vienen en el envase.**
- No use cucharas de la cocina. No utilice cucharas de cocina, ya que no tienen un tamaño o medida estándar.
- No le dé acetaminofén con otro medicamento que también contenga acetaminofén.
- Puede darle una dosis cada 4 o 6 horas, hasta un máximo de 4 dosis en un período de 24 horas. No le dé más de la dosis indicada en la tabla.
- Evite tomar alcohol. Algunos medicamentos, como los jarabes para el resfriado, pueden contener alcohol. Tomar acetaminofén con alcohol puede dañar al hígado.
- Si su bebé es menor de 6 meses de edad, hable con el médico de su bebé antes de darle acetaminofén.
- **No le dé ibuprofén y acetaminofén al mismo tiempo.**
- **¡Una sobredosis puede causar daño permanente al hígado o la muerte!**
- **Mantenga el acetaminofén en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.**
- Si su hijo ha tomado demasiado acetaminofén, comuníquese con el médico de **INMEDIATO.**