

# Ibuprofen Dosage Chart FOR PAIN AND/OR FEVER

Weight Range	Age Range	Infant Drops 50 mg / 1.25 mL	Children's Liquid 100 mg/ 5 mL	Children's Chewable Tablets 50 mg/tablet	Junior Strength Chewable Tablets 100 mg/tablet
0-11 lbs.	0-5 months	Do not give	Do not give	Do not give	Do not give
12-17 lbs.	6-11 months	1.25 mL	2.5 mL	Do not give	Do not give
18-23 lbs.	12-23 months	1.875 mL	4 mL	Do not give	Do not give
24-35 lbs.	2-3 years	2.5 mL	5 mL	2 tablets	Do not give
36-47 lbs.	4-5 years	3.75 mL	7.5 mL	3 tablets	Do not give
48-59 lbs.	6-8 years	5 mL	10 mL	4 tablets	2 tablets
60-71 lbs.	9-10 years	—————	12.5 mL	5 tablets	2½ tablets
72-95 lbs.	11 years	—————	15 mL	6 tablets	3 tablets

- **Always use an accurate measuring dropper, syringe or cup.**
- **Only use the infant dropper in the package to give an infant drops.**
- Talk to your infant's health care provider before giving ibuprofen if your infant is younger than 6 months old.
- You may give a dose every six to eight hours, up to four doses in 24 hours. Do not give more than the dosage chart says.
- If your child has vomiting, diarrhea, stomach pain, a history of an ulcer, or is allergic to aspirin or ibuprofen, talk to your child's health care provider before giving your child ibuprofen.
- Do not give ibuprofen with another medicine that also contains ibuprofen.
- **Do not give both ibuprofen and acetaminophen at the same time.**
- **Store ibuprofen in a cool dry area, away from the reach of children.**
- Contact your child's health care provider **RIGHT AWAY** if your child takes too much ibuprofen.



scdhec.gov

# Tabla de dosificación de ibuprofeno PARA EL DOLOR Y/O LA FIEBRE

Rango de peso	Rango de edad	Gotas para bebés  50 mg / 1.25mL	Líquido para niños  100 mg / 5mL	Comprimidos masticables para niños  50 mg/tableta	Comprimidos masticables "Junior Strength"  100 mg/tableta
0-11 lbs.	0-5 meses	No se debe dar	No se debe dar	No se debe dar	No se debe dar
12-17 lbs.	6-11 meses	1.25 mL	2.5 mL	No se debe dar	No se debe dar
18-23 lbs.	12-23 meses	1.875 mL	4 mL	No se debe dar	No se debe dar
24-35 lbs.	2-3 años	2.5 mL	5 mL	2 tabletas	No se debe dar
36-47 lbs.	4-5 años	3.75 mL	7.5 mL	3 tabletas	No se debe dar
48-59 lbs.	6-8 años	5 mL	10 mL	4 tabletas	2 tabletas
60-71 lbs.	9-10 años	—————	12.5 mL	5 tabletas	2½ tabletas
72-95 lbs.	11 años	—————	15 mL	6 tabletas	3 tabletas

- **Siempre utilice un gotero, una jeringa o una taza medidora.**
- **Para medir las gotas para el bebé, use solamente los goteros que vienen con el medicamento.**
- Si su bebé es menor de 6 meses de edad, hable con el médico de su bebé antes de darle ibuprofeno.
- Puede darle una dosis cada 6 a 8 horas, hasta un máximo de 4 dosis en un período de 24 horas. No le dé más de la dosis indicada en la tabla.
- Si su hijo tiene vómitos, diarrea, dolor de estómago, antecedentes de úlcera, o es alérgico a la aspirina o al ibuprofeno, hable con el médico de su niño antes de darle ibuprofeno.
- No le dé ibuprofeno con otro medicamento que contenga ibuprofeno.
- **No le dé ibuprofeno y acetaminofén al mismo tiempo.**
- **Mantenga el ibuprofeno en un área fresca y seca, fuera del alcance de niños.**
- Comuníquese con el médico de su hijo INMEDIATAMENTE si su hijo toma demasiado ibuprofeno.