



## ¿Qué pueden hacer los cazadores de cerdos salvajes para protegerse y proteger y a sus familias de la brucelosis?

### ¿Qué es la brucelosis?

La brucelosis (también llamada “fiebre de Malta” o “fiebre ondulante”) es una infección causada por varias especies de bacterias del género *Brucella*. Estas bacterias suelen infectar a animales como el ganado vacuno, ovino, caprino y porcino; los perros; y los cerdos salvajes y otros animales de caza. La brucelosis puede transmitirse de los animales infectados a las personas en determinadas situaciones.

**En Carolina del Sur, la mayoría de los casos de brucelosis provienen del contacto con un cerdo salvaje infectado.**



### ¿Cuáles son los síntomas de la brucelosis?

En general, los síntomas no son específicos y pueden incluir lo siguiente:



Fiebre



Pérdida de peso



Sudoraciones nocturnas



Cansancio



Dolor articular y muscular



Dolor de cabeza

En algunos casos, se producen **infecciones de larga duración en el cerebro, el corazón, el bazo o el hígado**, lo cual puede causar una forma **grave de la enfermedad o la muerte**.

**En la mayoría de las personas, los síntomas aparecen durante las primeras ocho semanas tras la exposición**, pero pueden tardar hasta **seis meses** en manifestarse.

## ¿Cómo se contagian de brucelosis los cazadores?

Los cazadores contraen la enfermedad cuando **la sangre o los líquidos corporales de un animal infectado entran en contacto con los ojos, la nariz, la boca o algún corte en la piel**. Esto puede suceder cuando un cazador:



Despelleja o eviscera un animal.



Faena un animal.



Entra en contacto con un perro de caza infectado.



Prepara la carne para su cocción.



Come la carne de la presa poco cocida.

## ¿Cómo se puede prevenir la brucelosis?

Hay varias formas de mantenerse y de mantener a su familia a salvo de la brucelosis:




- **NO se acerque a animales salvajes enfermos o muertos.**
- **NO coma carne de animales que hayan estado enfermos o que haya encontrado muertos.**
- **NO toque la canal de un cerdo salvaje con las manos descubiertas.**
- **NO alimente a los perros de caza con carne cruda de las presas ni los deje jugar con restos de presas muertas. Si su perro muestra signos de la enfermedad, como pérdida de peso, glándulas o testículos inflamados, aborto espontáneo, baja fertilidad o, en el caso de un cachorro, debilidad, contacte a su veterinario.**



- **Cuando manipule un cerdo salvaje, use elementos de protección, como guantes de goma, guantes resistentes a los cortes y una mascarilla.**
- **Use botas que se puedan desinfectar fácilmente.**
- **Lávese las manos con agua y jabón siempre que manipule un cerdo salvaje o carne.**
- **Limpie y desinfecte todos los cuchillos y demás instrumentos.**
- **Cocine la carne a una temperatura interna de 160° F antes de consumirla.**

## ¿Cómo se diagnostica y se trata la brucelosis?

Su médico le realizará un análisis de sangre para chequear si tiene brucelosis. Los pacientes con brucelosis reciben un tratamiento con antibióticos durante al menos seis semanas. Algunos pacientes pueden necesitar tratamientos más prolongados en función de la gravedad y del lugar de la infección.



Si presenta síntomas entre una semana y seis meses después de manipular un cerdo salvaje, llame a su médico y dígame que ha cazado cerdos salvajes.

Para obtener más información, visite: [cdc.gov/brucellosis/about](https://www.cdc.gov/brucellosis/about).

